

Skötselråd Kinesisk grottgecko



Detta är ett skötselråd från Tropiska Rum Zoologiska. Titta gärna in på vår hemsida, www.tropiskarum.se, för senaste nytt. Reservation för feltryck.

- Art:** Kinesisk grottgecko - *Goniurosaurus lichtenfelderi*
- Ursprung:** Kina, Vietnam
- Längd:** upp till 18 cm
- Livslängd:** 10-15 år
- Könsskillnader:** Hanen har större femoralporer, på insidan av låren. Hanen har dessutom två tydliga bulor vid svansroten, där hans hemipenisar ligger. Båda dessa sätt att bestämma kön gäller vuxna djur.
- Temperatur:** Dag 25-28° C. Natt ej under 20° C.
- Foder:** Grottgeckon lever uteslutande av animaliskt foder. Grundfodret är syrsor, men även mjölmask, zophobaslarven och kackerlackor brukar ätas med god aptit. Någon gång ibland kan även en pinkis ges. Tänk på att anpassa foderdjuret efter ödlans storlek. Fodret bör aldrig vara större än halva ödlans huvudstorlek. Gärna mindre. Unga individer matas sex gånger per vecka, halvvuxna och vuxna individer matas 2-4 gånger per vecka.
- Det är viktigt att ge Geckon extra tillskott av kalcium, vitaminer och mineraler. Detta gör man enklast genom att skaka foderdjuren i ett kombinerat kalcium/vitaminpreparat. Tänk på att kalciumet ska vara fosforfritt.
- Bostad:** Den Kinesiska grottgeckon ska ha ett terrarium med hög luftfuktighet och gott om gömställen.
- Som bottenmaterial kan man använda en blandning av torv och kokoschips eller bark. I zoohandeln finns, förutom bark även "Plantation soil" och "Coco Husk". En blandning av dessa ger ett bra bottenmaterial med god förmåga att hålla uppe fuktigheten i terrariet.
- Den generella luftfuktigheten i terrariet löser man genom att duscha rikligt med en blomspruta, el. likn, varje morgon. Man kan även använda en s.k. Fogger, för att tillföra fukt mer kontinuerligt. Dessa finns i olika storlekar, för olika behov.
- Under dagen håller geckon mest till i de fuktiga gömställena, som man lättast ordnar med grottor eller korkbark. Man kan även använda stenar för att bygga upp gömställena, men tänk då på att de förankras noga, så att de inte faller ner på ödlorna.
- Eftersom Grottgeckon är nattaktiv, så behövs ingen UV-lampa.
- Terrariets storlek finns beskrivet i tabellen på, nästa sida.
- Övrigt:** En vuxen Grottgecko ömsar skinn ca 6 gånger om året, och en unge betydligt oftare. Trots detta hittar man ytterst sällan något ömsat skinn i terrariet. Detta beror på att geckon äter upp sitt eget skinn, efter ömsning, och på detta sätt får i sig extra kalcium.

DFS 2005:8
Saknr L 80

2 Utrymme för ödlor av marklevande arter

Ödlans längd (cm)	Minsta tillåtna yta (m ²)	Minsta yta per icke köns-mogen ödla vid grupp-hållning (m ²)	Minsta yta per köns-mogen ödla vid grupp-hållning (m ²)	Minsta höjd (m)
Upp till 10	0,06	0,0075	0,03	0,2
10-15	0,09	0,011	0,045	0,2
16-20	0,16	0,02	0,08	0,3
21-30	0,36	0,045	0,15	0,3
31-40	0,64	0,08	0,32	0,4
41-50	0,9	0,15	0,45	0,5
51-75	1,8	0,3	0,9	0,6
76-100	2,5	0,6	1,25	0,75
101-125	3,0	1,0	1,5	0,9
126-150	4,0	2,0	2,0	1,0
151-200	5,0	2,5	2,5	1,0

Ödlans längd mäts från nosspetsen till svansspetsen; vid avbruten eller regenererad svans gäller uppskattat mått med ursprunglig svanslängd.

Som icke köns-mogen räknas en ödla fram till dess att den uppnår halva sin vuxna längd och innan den börjar visa tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder.

Som köns-mogen räknas en ödla efter att den uppnått mer än halva sin vuxna längd eller om den dessförinnan visar tecken på könsrelaterad rivalitet och aggressivitet mot artfränder.